

## UTILIZZO DINOPROSTONE ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI AIFA DEL LUGLIO 21

### Confronto preparazioni

|                           | <b>Prepidil 05/3mg</b><br>gel endocervicale   | <b>Prepidil 1/3 mg</b><br>gel endovaginale  | <b>Propess</b><br><b>Dinoprostone 10 mg</b>  |
|---------------------------|---|---|--|
| Indicazione               | Induzione maturazione cervicale   | <b>Induzione travaglio parto</b>  | Induzione maturazione cervicale  |
| Ripetizione Dose          | 2 a distanza di 6 ore + ev 3 <sup>a</sup> dose  | 2 a distanza di 6 h.<br>La 2 <sup>a</sup> somministrazione può essere di 1mg,<br>se risposta già innescata o 2 mg in<br>mancanza di risposta  | Somministrazione unica.<br><b>Rimozione dopo 24 h o a inizio<br/>del travaglio (contrazioni ogni 3<br/>minuti)</b>   |
| Epoca gestazionale        |   | <b>a termine o presso il termine</b>  | ≥37 settimane +6   |
| Controindicazioni         | Precedente TC/isterotomia;<br>Sproporzione feto/pelvica;<br>Pregressi travagli difficili e/o parti<br>traumatici<br>Multiparità (≥ 6 parti);<br>Perdite ematiche vaginali in<br>gravidenza dnnd;<br>CTG non reattivo;<br>Iperesensibilità al prodotto | Precedente TC/isterotomia;<br>Sproporzione feto/pelvica;<br>Pregressi travagli difficili e/o parti<br>traumatici<br>Multiparità (≥ 6 parti);<br>Perdite ematiche vaginali in<br>gravidenza dnnd;<br>CTG non reattivo;<br>Iperesensibilità al prodotto | Precedente TC/isterotomia;<br>Sproporzione feto/pelvica;<br>Pregressa chirurgia maggiore della<br>cervice<br><br>CTG non reattivo;<br>Iperesensibilità al prodotto |
| Cautele                   | Compromissione cardiovascolare,<br>epatica, renale, asmatica<br>PROM<br>Gravidanza multipla<br>Età ≥35 anni x rischio CID<br>EG >40 settimane   | Compromissione cardiovascolare, epatica,<br>renale, asmatica<br>PROM<br>Gravidanza multipla<br>Età ≥35 anni<br>EG >40 settimane   | Anamnesi positiva per ipertono<br>Glaucoma, Asma<br>>3 pregressi parti a termine<br>Gravidanza multipla<br>Età ≥35 anni<br>EG >40 settimane                        |
| Antagonizzazione effetti  |   | Farmaci Beta mimetici   | Rimozione dispositivo  |
| CTG                       | Continuo  | Continuo  | Frequente  |
| Intervallo con ossitocina | 6-12 ore  | 6-12 ore  | <b>30 minuti</b>   |